


わが家の稲作設計書 追加資料


水田雑草葉齡別の写真

タイヌビエ(イネ科)




1.2葉期

1.5葉期



2葉期




3葉期




圃場中での1.5葉期の
タイヌビエ


イヌホタルイ(カヤツリグサ科)



コナギ(ミズアオイ科)




アゼナ(アゼナ科)



アゼナ
アメリカアゼナ
タケトアゼナ
ウキアゼナ
などが存在する。

オモダカ(オモダカ科)



クログワイ(カヤツリグサ科)



初生葉



本葉の抽出



成植物




クログワイ塊茎

シズイ(カヤツリグサ科)



コウキヤガラ(カヤツリグサ科)



発生始め



本葉の抽出



成植物



似ている雑草の見分け方

①ホタルイvsコナギ

イヌホタルイ




コナギ



ホタルイ:一直線上に葉を展開する



コナギ:あらゆる方向に葉を展開する



コナギは子葉の先に種子の殻がついている



似ている雑草の見分け方

②ホタルイvsクログワイ

イヌホタルイ

クログワイ

初期



ホタルイ: 最初に横向きに葉が展開する

クログワイ: 最初から垂直方向に葉が抽出する

ホタルイ

クログワイ



葉の先端に
白線



葉先が尖る

花が咲く

花がほとんど
咲かない



葉先が丸い



基部に白い膜
が張る

一年生広葉

